



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАнето  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СЛИВЕН



Изх. № ..... 00-944-2/10.08.2021

ДО  
Г-ЖА МИЛЕНА ЧОЛАКОВА  
НАЧАЛНИК  
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
ГР. СЛИВЕН

КОПИЕ ДО

Г-Н СТЕФАН РАДЕВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА СЛИВЕН

Г-Н НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ  
КМЕТ  
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Г-Н КОСТА КАРНАШЕВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА КОТЕЛ

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Г-Н МИНЧО АФУЗОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ

Относно: *Имунизации срещу COVID-19 на лица над 12 години*

УВАЖАЕМА ГОСПОДОЧКА ЧОЛАКОВА,

Във връзка с взето решение на Областен кризисен щаб на Област Сливен от проведеното заседание на 10.08.2021г., приложено за сведение и ползване, изпращам Ви следната информация за провеждането на имунизации срещу COVID-19:

Ваксините, с които България провежда имунизационната си кампания, са преминали успешно клинични изпитвания. Те са сигурни и ефективни. Вирусите еволюират, заразяват все повече хора и по този начин продължават да се разпространяват. Най-добрата защита от COVID-19 е имунизацията.

Ваксините са бесплатни, имунизацията не е обвързана със здравноосигурителния статус на гражданите и е възможно всеки да направи своя избор на ваксина. Общопрактикуващите лекари и лекарите в разкритите специализирани имунизационни кабинети на територията на Област Сливен разполагат с всички ваксини, одобрени от Европейската агенция по лекарствата.

**Децата и ваксините:**

Съгласно промени в Кратките характеристики на продуктите, иРНК - ваксините Comirnaty и Spikevax могат да бъдат прилагани на лица над 12 години.

Най-честите нежелани реакции при деца на възраст от 12 до 17 години са сходни с тези, които са наблюдавани при хора на и над 18 години. Те включват болка и оток на мястото на инжектиране, умора, главоболие, болка в мускулите и ставите, уголемени лимфни възли, втрисане, гадене, повръщане и повишена температура. Тези нежелани реакции обикновено са в лека до умерена степен и се подобряват в рамките на няколко дни след ваксинация.

Ползите от ваксините надвишават рисковете и при деца на възраст от 12 до 17 години, по-конкретно при тези от тях, които са със придружаващи заболявания, които биха повишили риска от тежко протичаща COVID-19 инфекция.

Повече информация на официалния сайт: <https://coronavirus.bg/bg/vaccinations>

Актуализирана продуктова информация на ваксини срещу Covid 19:  
<https://www.bda.bg/bg/covid-19>

С уважение,  
д-р ПЕТЯ БАЛУЛОВА  
Директор на Регионална здравна инспекция

